

Общие характерные признаки заболевания

К ранним признакам заболевания относятся следующие:

1. Нарушения аппетита:
 - появление неестественной для ребенка тяги к сладкому;
 - стремление есть часто, то есть ребенок из-за сильного чувства голода с трудом выдерживает традиционные 3-4 часовые перерывы между приемами пищи;
 - слабость и сонливость через 1,5-2 часа после еды.
2. Ребенок худеет, несмотря на нормальный и даже повышенный аппетит.
3. Ребенок быстро устает, становится вялым, сонным.
4. Ребенок начинает больше пить и чаще мочиться.
5. Пятна мочи на горшке, в туалете, на подгузниках становятся липкими.

Более поздними симптомами и последствиями сахарного признака являются:

- тошнота и рвота;
- боли в животе;
- сухость и зуд кожи;
- признаки нейродермита;
- упорный фурункулёз, пиодермия;
- нарушение зрения.

Это признаки того, что болезнь уже набрала силу и приостановить ее развитие будет крайне сложно.




Рекомендации для родителей при выявлении признаков сахарного диабета

При первых же подозрениях на сахарный диабет у ребенка для обследования, уточнения диагноза и назначения адекватного лечения, необходимо посетить следующих специалистов:

- педиатра;
- эндокринолога.

При несвоевременном выявлении и проведении лечебных мероприятий данное заболевание инвалидизирует ребенка, приводя его к ограничениям в следующих категориях жизнедеятельности:

- самообслуживание;
- обучение.



Министерство социального развития
Пермского края

РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ ПРИЗНАКОВ САХАРНОГО ДИАБЕТА У ДЕТЕЙ

Сахарный диабет - это хроническое заболевание эндокринной системы, появляющееся из-за дефицита инсулина – особого гормона поджелудочной железы.



Сахарный диабет у детей сопровождается нарушением всех видов обмена веществ в организме: углеводного, белкового, жирового, минерального и водно-солевого.

Заболевание может возникнуть в любом возрасте. Особенно опасным периодом для заболевания детей является возраст 7-10 лет — период усиленного роста.



Причины сахарного диабета:

Все причины сахарного диабета до сих пор не выявлены.

Существуют **параметры**, соответствующая которым, ребёнок с большей вероятностью может заболеть сахарным диабетом.

- Отягощённая наследственность.
- Раннее отлучение от грудного молока в младенчестве. Искусственные смеси содержат чуждый для неокрепшего организма белок коровьего молока, который может повлиять в дальнейшем на обмен веществ.
- Потребление сладостей в большом количестве.
- Лишний вес.
- Наличие тяжёлых инфекционных заболеваний в анамнезе.
- Чрезмерные нагрузки как физического, так и психического плана. Пусковым моментом заболевания чаще всего становится инфекция или стресс.



Основные формы диабета

Выделяют два основных типа сахарного диабета:

1. **Инсулинозависимый диабет (диабет 1 типа)** - обычно передаётся по наследству и характеризуется очень низким уровнем инсулина в крови, вследствие чего, большой сахарным диабетом зависит от лечения инсулином.

2. **Инсулинонезависимый диабет (диабет 2 типа)** - инсулина в организме достаточно, но ткани к нему невосприимчивы или этот гормон неэффективно выполняет свою функцию вследствие нарушения обмена веществ.

Если среди взрослого населения преобладает сахарный диабет 2-го типа, то среди детей преобладает сахарный диабет 1 типа (инсулинозависимый).

