

✓ *Нарушения речи:* может отмечаться общее недоразвитие речи, проявляющееся скудностью активного словаря, упрощенным построением фраз, аграмматизмами, нередко косноязычием.

✓ *Недоразвитие моторики* проявляется недостаточностью точных и тонких движений, особенно мелких, медленностью выработки двигательной формулы действия. Нередко отмечается недостаточность мышечной силы.

✓ *Нарушения со стороны эмоционально-волевой и поведенческой сфер:* слабость познавательной активности и волевой регуляции поведения, прежде всего на ограниченности высших эмоций - эстетических, нравственных, интеллектуальных, сочетающихся с отсутствием устойчивой мотивации поведения, с её большой зависимостью от внешних, случайных влияний среды и неспособностью самостоятельно подавлять инстинктивно возникающие низшие потребности и влечения.



Рекомендации для родителей при выявлении признаков умственной отсталости

При подозрениях на данное заболевание у ребенка для обследования, уточнения диагноза, назначения адекватного лечения и психолого-педагогического сопровождения необходимо посетить следующих специалистов:

- ✓ детского невролога;
- ✓ детского психиатра;
- ✓ медицинского психолога;
- ✓ педагога-психолога;
- ✓ логопеда (в случае нарушений речи).

Перед систематическим школьным обучением детям с интеллектуальным дефектом рекомендовано пройти психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК) для определения нуждемости в специальных условиях обучения (программы обучения и воспитания, формы обучения, нуждемости в специальных учебных пособиях и дидактических материалах, технических средствах обучения, коррекционных занятиях, услугах ассистента).



Министерство социального развития
Пермского края

РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ ПРИЗНАКОВ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ





Умственная отсталость – это состояние задержанного или неполного развития психики, которое, в первую очередь, характеризуется нарушением способностей, проявляющихся в период созревания и обеспечивающих общий уровень интеллектуальности, т. е. когнитивных, речевых, моторных и социальных способностей. Синонимы: «общее психическое недоразвитие», «психическое недоразвитие», «олигофрения».



Основные причины возникновения заболевания

Такое заболевание как «умственная отсталость» может быть вызвано следующими факторами:

- ✓ генетические причины умственной отсталости;
- ✓ внутриутробное поражение плода нейротоксическими факторами физической (ионизирующее излучение), химической или инфекционной (цитомегаловирус, сифилис и др.) природы;
- ✓ значительная недоношенность;
- ✓ нарушения в процессе родов (асфиксия, родовая травма);
- ✓ травмы головы, гипоксия головного мозга, инфекции с поражением центральной нервной системы;
- ✓ педагогическая запущенность в первые годы жизни у детей из неблагополучных семей;
- ✓ умственная отсталость неясной этиологии.



Классификация умственной отсталости

1. Лёгкая УО – дебильность (IQ 50–69).
2. Умеренная УО – имбецильность (IQ 35–49).
3. Тяжёлая УО – имбецильность, тяжёлая умственная субнормальность (IQ 20–34).
4. Глубокая УО – идиотия (IQ < 20).

Основные признаки психического недоразвития

- ✓ *Интеллектуальный дефект* у этих детей, проявляется в первую очередь нарушениями мышления: тугоподвижностью, установлением главным образом частных конкретных связей, неспособностью к отвлечению.
- ✓ *Расстройства внимания* характеризуются недостаточной произвольностью и целенаправленностью, сужением объема, трудностью сосредоточения, а также переключения.
- ✓ *Расстройства памяти* характеризуются слабостью смысловой и особенно ассоциативной памяти. Новые сведения усваиваются с большим трудом.