

Атонические приступы у детей

Атонические припадки характеризуются резкой потерей сознания и сильным расслаблением всех мышц ребенка. Дети с такими приступами могут внезапно падать, ударяться и при этом кажутся чрезвычайно вялыми и слабыми. Очень часто атонические приступы бывают совершенно неотличимы от обмороков, поэтому всех детей перенесших несколько эпизодов обморока следует показать врачу.

Детский спазм

К основным симптомам относятся: приведение рук к груди, наклон головы или всего туловища вперед и выпрямление ног. Часто приступы детского спазма случаются утром, сразу после пробуждения ребенка.

Приступы детского спазма могут длиться всего несколько секунд и захватывать только небольшую часть мышц шеи (при этом ребенок будет периодически бессознательно кивать головой). Чаше всего детским спазмом болеют дети в возрасте от 2 до 3 лет. К 5-ти летнему возрасту детский спазм может бесследно исчезнуть или превратиться в другую форму эпилепсии.



Рекомендации для родителей эпилепсии

При первых же подозрениях на эпилепсию у ребенка для обследования, уточнения диагноза и назначения адекватного лечения, необходимо посетить следующих специалистов:

- детского невролога;
- эпилептолога;
- психиатра;
- медицинского психолога;
- логопеда (в случае нарушений речи).

При несвоевременном выявлении, отсутствии или недостаточности проведения лечебно-реабилитационных мероприятий данное расстройство приводит к снижению интеллекта и инвалидности ребенка, ограничивая его в следующих категориях жизнедеятельности:

- обучение;
- самообслуживание;
- контроля за своим поведением.



Министерство социального развития
Пермского края

РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ ПРИЗНАКОВ ЭПИЛЕПСИИ У ДЕТЕЙ



Эпилепсия - тяжёлое хроническое заболевание, которое возникает чаще всего в детском возрасте, характеризуется специфическими припадками, называемыми эпилептическими.

Причины эпилепсии:

- наследственная предрасположенность;
- структурный дефект головного мозга (кисты, опухоли, кровоизлияния, травмы);
- аномалии развития головного мозга;
- гипоксия плода;
- тяжёлая комбинированная желтуха новорожденных;
- вирусные и паразитарные заболевания мозговых оболочек;
- болезнь Дауна;
- ЧМТ.

Также болезнь может возникнуть спонтанно, когда причины заболевания выявить не удается.




Классификация

Формы по локализации:

1. Фокальные (парциальные, роландические приступы, идиопатическая заточная эпилепсия, синдром Панайотопулоса).
2. Генерализованные (идиопатические неонатальные судороги, мультифокальная эпилепсия раннего детского возраста, ювенильная абсанс-эпилепсия) - распространяющиеся на весь мозг и на все тело.
3. Имеющие сходство с генерализованными и фокальными.

Формы по этиологии:

1. Идиопатические - генетически детерминированные, обычно генерализованные, дебют в детском и подростковом возрасте, часто носит наследственную природу.
2. Симптоматические (с известной этиологией и верифицированными структурными изменениями в мозге), чаще являются фокальными.
3. Криптогенные - не удается установить причину.



Основные симптомы эпилепсии

Симптомы эпилепсии зависят от формы болезни, к основным из них относятся:

- конвульсии - ритмичные сокращения мышц всего тела;
- потеря сознания;
- временная остановка дыхания, непроизвольная потеря мочи и кала;
- сильное напряжение мышц всего тела (сгибание рук в локтях, сильное выпрямление ног);
- беспрерывные движения в одной из частей тела ребенка: подергивание рук или ног, сведение или сморщивание губ, запрокидывание глаз назад и форсированный поворот головы в одну сторону.

Кроме типичных (судорожных) форм эпилепсии есть некоторые другие формы эпилепсии симптомы, которых имеют некоторые особенности и не всегда могут быть распознаны родителями.

Абсансная эпилепсия у детей

Основные признаки:

- внезапное прерывание деятельности ребенка (он замирает на полуслове или, не завершив начатое движение);
- пристальный или отсутствующий взгляд, сконцентрированный на одной точке;
- невозможность привлечь внимание ребенка;
- после прекращения приступа ребенок продолжает начатое действие и ничего не помнит о случившемся приступе.